Observation sur une fracture complette et compliquée avec deperdition de substance n° 38.

touts nos livres sont pleins dobservations sur la maladie que je vais communiquer, et lon pourroit dire quil ny rien a adjouter a ce qu'a dit sur ce sujet le sçavant mr petit dans son traitté des maladies des os, et dans les cas qui se Ressemblent le plus, il ne se rencontroit toujours quelque difference qui oblige le chirurgien a tenir une route un peu differente de celle quil a prescrit.

le 13e mars 1739 on avoit porté dans un chariot au lieu de Sauvian, eloigné de la mettairie du negre, denviron une lieüe, le nommé jacques Robert berger de lad. mettairie agé denviron 24 a 26 ans, vers les sept heures du soir un exprez vint me querir, je trouvay le malade sur son lit, et avec luy le sr Beloussiere md. chirurgien qui travailloit a un appareil. avant de detailler la maladie dont il sagissoit je crois devoir en rapporter la cause.

le nommé Robert etoit berger et faisant paitre son troupeau, trois autres bergers vinrent luy disputer le terrain quil occupoit; lun deux luy donna un coup de batton sur le derriere de la jambe et le fit

ARC 39 n° 151

tomber a la renverse pendant quil se deffendoit contre
les autres, apres quoy ils luy frapperent la meme jambe
de plusieurs coups de battons. touts ces coups portez
a peu pres au meme endroit firent une playe contuse
denviron 3 pouces et demy de longueur sur un et demy
de large. le tibia et le perone furent fracturez,
dans tout cet espace je trouvay toute la partie
anterieure du tibia brisée et la moëlle meme emportée
de maniere quil ne restoit ~~en partie~~ entiere quune languette
de la face posterieure de los, encore etoit elle
fracturée en travers, et les deux bouts qui chevauchoient
lun sur lautre sortoient de la playe; touts les morceaux
dos fracturez de grandeur et figure inegalle etoint nichez
dans les fibres charnues des muscles jumeaux et solaire,
dans le jambier et peronnier anterieurs, dans les teguments,
et plusieurs arteres etoient ouvertes
~~et larter poplitée qui etoit ouverte~~, mais les caillots
avoient arretté lhemoragie. il est aizé de juger de la
contusion qui accompagnoit ce delabrement, suite de
plusieurs coups reiterez, le perone etoit simplement
fracturé.

ce ne fut quapres plusieurs operations que je connus tout
ce le desordre et que je parvins a faire la reduction

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

je fis une incision longitudinale a la partie superieure anterieure de la jambe finissant a sa partie moyenne, d'environ 4 pouces de longueur, je reduisis ou mis en place les extremittez tibiales autant que le cas me le permettoit, je tiray plusieurs esquilles detachées de leur tout la plus petite etant de de la grosseur du pouce. je fis une seconde incision transversale sur les muscles jumeaux, solaire et plantaire et sur le jambier, de trois pouces de longueur, cette incision me facilita l'extraction des pieces d'os qui etoient cantonée: dans le corps de ces muscles, elle me procura d'ailleurs plus d'aizence a faire la ligature a l'artere tibiale et a une des divisions de la poplitée, et a tirer les esquilles qui l'avoient ouverte et qui avoient dechiré ses membranes. apres ses operations et avoir fait l'extraction de ses corps etrangers, je fis faire des nouvelles extensions. j'ay dit qu'apres la p.re incision je reduisis les extremittez tibiales, parcequ'elles etoient saillantes, c'est que si les deux bouts l'eussent été assujetis, j'aurois été gené lors de l'extraction des corps etrangers, cette precaution me paroit necessaire, car il est

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

certain que, sans elle, j'aurois peut etre ocasionné des nouvelles douleurs lors des opérations par lebranlement que les deux extremittez auroient pû souffrit, je fis faire donc des nouvelles extensions, et je Reunis avec mes deux mains appuyées aux parties laterales de la jambe quelques pieces fracturées les mettant a leur niveau autant que, la deperdition de substance lexigeoit.

Les pieces d'os etant Reduittes autant quil me fût possible je les soutins en leur place par plusieurs bourdonets de charpie, et entr'autres par un dont, je Remplis ce qui Restoit du canal osseux dont la moelle avoit été confondue dans le delabrement, le tout soutenu par des petites compresses appropriées. La playe tranzversalle fut pancée de meme avec de la charpie; et pour soutenir la ligature que j'avois fait a lartere et empecher que la colonne du sang ne la fit sauter, je mit sur son progrés au dessus de la ligature un petit Rouleau de charpie un peu fermé soutenu d'une petite compresse et du Reste de la charpie. je mit des longuettes

capables de soutenir en leur place les bouts du peronné fracturé, [illegible] des compresses circulaires &c. le tout maintenu par un bandage a dix et huit chefs; le tout arrosé d'eau de vie.

n'ayant pas de boëtte convenable je mis des fanons et la semelle a l'ordinaire.

deux heures apres je saignay le malade, il le fût une seconde fois dans la nuit, et l'appareil fût rehumecté de tems en tems avec le vin et l'eau de vie. Le lendemain le malade fût saigné encore quatre fois, je pensay sa playe avec un digestif animé; la jambe fût placée dans une boëtte telle qu'on s'en sert dans les fractures, et l'appareil fût arrosé de tems en tems dans la journée.

je continuay les pencements selon l'art; la suppuration s'établit bien, et il ne survint aucun accident, pendant la première quinzaine il sortit avec le pus dans les pencements nombre de petites pieces d'os nichées dans les chairs, et qui n'avoient echapé le premier jour. Les chairs pousserent peu a peu et la playe fût plus de trois mois a se cicatriser. –

le malade n'a pû marcher avec des bequilles qu'au

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

bout de quatre mois, n'ozant encore appuyer sur sa jambe. en moins de dix mois la partie s'est affermie au point que ce berger a peu garder son troupeau a l'ordinaire. la jambe paroit environ d'un demy pouce plus courte que l'autre, mais elle est aussy ferme

a beziers ce 20 Xbre 1743. Signé Bailleron

Bailleron chirurgien et lieutenant de Mr le premier chirurgien du Roy